

NoroTec™ Mangaani

Mangaanipohjainen lannoiteliuos – EY lannoite

Käyttötarkoitus: Lehtilannoite vilja- ja puutarhakasvien mangaanipuutteeseen.

Sisältö per litra: 150 g mangaania, 80 g rikkiä +/-10%. Sisältö on kompleksidottu orgaanisten happojen ja aminohappojen kanssa.

Käyttö: Mangaanin puute aiheuttaa viljakasveilla harmaalaikkutautia. Lehtiin ilmestyy harmaita tai ruskeita laikkuja pitkittäin tai pieniä keltaisia laikkuja, lajista riippuen. Lievissä tapauksissa kasvusto näyttää vain normaalia vaaleammalta. Jyvien ja röyhyjen muodostus jää heikoksi.

NoroTec™ Mangaania tulisi käyttää aikaisessa vaiheessa parhaan tehon saamiseksi. Kokemusten mukaan hiekkaiset maaperät, korkea pH, korkea multapitoisuus sekä kylmä ja märkä sää vaikuttavat mangaanin puutteeseen. Herkimmät viljelyskasvit ovat kaura, vehnä, rapsi, sokerijuurikas ja peruna.

Alhaista annostusta käytetään ennaltaehkäisevänä käsittelynä ja korkeampaa annostusta puutostiloissa. Käsittely uusitaan tarvittaessa, uusinta kertaalleen on suositeltavaa. Ensimmäinen käsittely voidaan tavallisesti tehdä rikkaruohotorjunnan yhteydessä. Käytettävissä ainoastaan todettuun tarpeeseen. Asianmukaisia käyttömääriä ei saa ylittää.

Annostus ja käsittelyajankohta

Viljelyskasvi	Käsittelyajankohta	Annostus	Vesimäärä ltr/ha
Korsivilja	Pensomisvaiheessa - Puutosta epäiltäessä - Todettu puute	0,5 1,5	100-200
Peruna	1. 2-3 vko kasvun alusta 2. Ennen kukintaa	0,5-1,00 0,5-1,0	200
Sokerijuurikas	1. 6-10 lehteä 2. 10 pvä myöhemmin	1,0 0,5	100-200
Rapsi	4-6 lehteä	1,0-1,5	100-200
	Varren kasvu – ennen kukintaa	1+2 l magnesium 1 l boori kompl.	
Herneet, pavut	4-6 lehteä	1,0	
Mansikat	Aikaisessa nappuvaiheessa	1,0	200-500
Vihannekset	1. Riittävä lehtiala 2. 10 pvä välein	1,0 1,0	200-500
Säilörehu- ja laidunnurmet	1. Aikaisin keväällä 2. 10-14 pvä välein	1,0 1,0	200

Sekoitettavuus: NoroTec™ Mangaani on kompleksidottu orgaanisten happojen ja aminohappojen kanssa ja on siksi sekoitettavissa useiden kasvinsuojelutuotteiden kanssa. Seuraa aina kyseessä olevan kasvinsuojelutuotteen etiketin ohjeita. Mikäli epäroit, tarkista aina sekoitusarvot. Kysy lisätietoja tarvittaessa toimittajaltasi.

Valmistus ja käsittely: Ruiskusäiliö täytetään ¼ vettä ja aineet lisätään alla olevin ohjein. Sekoittajan tulee olla käynnissä koko ajan.

- Torjunta-aineet ohjeiden mukaan
- NoroTec™ Mangaani
- Lisää vettä jäljellä oleva määrä
- Jos käytetään pelkästään NoroTec™ Mangaania, lisätään myös sidosnestettä

Varokeinot: Aurinkoisella säällä käsittely tehtävä aamulla tai illalla. Älä ruiskuta vettä kasveille jotka ovat märkiä tai jos on odotettavissa sadetta. Liuoksen lämpötila tulee olla käytettäessä väh. 10°C

Puhdistus: Puhdista kaikki ruiskutusvälineet ennen ja jälkeen käytön. Jos käytät suojeluainesekoitusta, seuraa suojeluaineen puhdistusohjeita. Puhdista tyhjä pakkaus huuhtelemalla kolme kertaa. Huuhteluvesi sekoitetaan käyttöliuokseen. Sekoitettaessa yhdessä

NoroTec™ Mangaani

torjunta-aineen kanssa, seuraa tarkasti torjunta-aineen puhdistusohjeistusta. Puhdistettu pakkaus vietävä lähimmälle hyötykäyttöasemalle.

Varoitus: Vaarallista terveydelle. Voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja pitkäaikaisessa altistumisessa hengitettäessä ja nautittuna. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

Ei lasten ulottuville. Vältä sisään hengittämistä ruiskusumuttaessa. Käytä sopivia suojahanskoja ja suojalaseja tai kasvonaamaria. Tätä tuotetta ja sen pakkausta on käsiteltävä vaarallisena jätteenä. Vältä päästöjä ympäristöön. Lue erilliset toimenpiteet/turvaselosteet. Ihmisten ja ympäristön riskien välttämiseksi, seuraa käyttöohjeita.

Varastointi: Säilytetään viileässä ja kuivassa lasten ja eläinten ulottumattomissa. Varastointilämpötila 0°C - +30°C. Säilyvyys 2 vuotta.

Lisätietoja: <http://www.soderbyentreprenad.fi>

Maahantuonti ja markkinointi Suomessa:

Söderby Entreprenad Ab
Åsbackavägen 768
68500 Kronoby
Puh. 050-5118941